

راهنمای تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا به زبان ساده

در صورتی که ۳ نوبت واکسن فعال مشابه هم
(آسترازنکا، اسپایکوژن، پاستوکوک و
پاستوکوک پلاس، رازی کوپارس) دریافت
کردید:

آسترازنکا، اسپایکوژن، پاستوکوک

در صورتی که ۳ نوبت واکسن غیر فعال
(سینوفارم، برکت، بهارات، فخر) دریافت
کردید:

همان نوع واکسن، آسترازنکا، اسپایکوژن،
پاستوکوک

واحد بیماری های واگیر
شمال غرب

در صورتی که ۳ نوبت واکسن فعال و متفاوت از هم (۲)
نوبت آدنوویروسی مانند آسترازنکا یا اسپوتنیک و ۱
نوبت پروتئین نوترکیب مانند اسپایکوژن یا پاستوکوک
پلاس و یا ۲ نوبت پروتئین نوترکیب مانند اسپایکوژن یا
پاستوکوک و ۱ نوبت آدنوویروسی مانند آسترازنکا یا
اسپوتنیک) دریافت کردید:

آسترازنکا، اسپایکوژن، پاستوکوک

در صورتی که ۲ نوبت واکسن غیر فعال
(سینوفارم، برکت، بهارات، فخر) و ۱ نوبت
واکسن فعال (آسترازنکا، اسپایکوژن،
پاستوکوک پلاس) دریافت کردید:
آسترازنکا، اسپایکوژن، پاستوکوک

راهنمای تزریق واکسن کرونا-تیر 1401

فاصله تزریق	نوبت سوم و چهارم	نوبت اول و دوم
نوبت اول و دوم 28 روز نوبت دوم و سوم 3 ماه نوبت سوم و چهارم 6 ماه	فعال: آسترازنکا، اسپوتنیک نوترکیب: اسپایکوژن، پاستوکوک، رازی، نورا	واکسن فعال یا نوترکیب
نوبت اول و دوم 28 روز نوبت دوم و سوم 3 ماه نوبت سوم و چهارم 6 ماه	غیرفعال: سینوفارم، بهارات، برکت، فخر نوترکیب: اسپایکوژن، پاستوکوک، رازی، نورا	واکسن غیرفعال

واکسن مجاز گروه سنی زیر 18 سال: پاستوکوک و سینوفارم می باشد.

گروه سنی 5 تا 12 مجاز به دریافت دو نوبت واکسن میباشند.

گروه سنی 12 تا 18 سال نوبت سوم واکسن را در صورت بیماری خاص مجاز به دریافت میباشند

گروه سنی 18 سال به بالا به شرط گذشت 6 ماه از آخرین نوبت واکسن مجاز میباشند.

واکسن مجاز در مادران باردار: سینوفارم_ آسترازنکا (در صورت تایید کمیته دانشگاه)

واکسن مجاز در مادران شیرده: سینوفارم_ بهارات

نوع واکسن نوبت اول و دوم باید مشابه باشند.

تهیه شده توسط مرکز بهداشت غرب_ واحد واگیر